

FIEVRE POST-OPERATOIRE EN OPHTALMOLOGIE

EN POST-OPERATOIRE, EN OPHTALMOLOGIE

Quelque soit l'intervention pratiquée :

- ▶ cataracte
- ▶ Intervention sur la rétine : décollement de rétine, membrane épirétinienne, etc
- ▶ glaucome
- ▶ etc



Jamais de fièvre




LES SYMPTOMES APPARAISSENT DANS LES 8 JOURS

- ▶ Douleur
- ▶ Baisse d'acuité visuelle brutale
- ▶ Œil rouge
- ▶ Œil sale


Dans tous les cas, en post-opératoire immédiat :

- ▶ Rien n'est banal
- ▶ Consultation (ou avis téléphonique) **EN URGENCE**

ENDOPHTALMIE AVEC HYPOPION



ENDOPHTALMIE AVEC HYPOPION




ABCES DE CORNEE + ENDOPHTALMIE




JAMAIS DE CORTICOÏDES SANS POUVOIR FAIRE UN EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

- ▶ A cause de l'herpès



Sans corticoïdes



Avec corticoïdes

UN MEDECIN DU SERVICE EST TOUJOURS JOIGNABLE

- ▶ Soit directement par téléphone en cliquant [ici](#)
- ▶ Soit par fax au 02 43 43 29 33